

Prueba de HPV para el cáncer cervical

El cáncer cervical es una enfermedad en gran medida prevenible. A partir del 3 de marzo de 2025, Ontario cambió del Papanicolaou (Pap test) a la prueba de HPV para la detección del cáncer cervical.

Detección del cáncer cervical

La detección significa revisar la presencia de una enfermedad en un grupo de personas que no presentan síntomas. Las pruebas de detección ayudan a encontrar el cáncer cervical antes de que aparezcan los síntomas. Cuando el cáncer cervical se detecta y se trata temprano, las probabilidades de un tratamiento exitoso son mayores.

El virus del papiloma humano (HPV) es un grupo de más de 100 tipos diferentes de virus relacionados. Se transmite por contacto íntimo piel con piel. La prueba de HPV analiza una pequeña muestra de células recolectadas para detectar los tipos de HPV de alto riesgo.

Ventajas de la prueba de HPV

- Mayor precisión (96% de sensibilidad frente al 53% del Papanicolaou).
- Resultados altamente consistentes, lo que permite intervalos más largos entre pruebas (cada 5 años en lugar de cada 3 años con el Pap).
- Mejor identificación de personas en riesgo y mayor comodidad para los pacientes.

Criterios de elegibilidad para la detección cervical

- Tener entre 25 y 70 años.
- Tener cuello uterino (cérvix), independientemente de la identidad de género.
- Haber sido sexualmente activo/a (incluyendo cualquier contacto genital con o sin penetración).
- No presentar síntomas que a veces se asocian con el cáncer cervical.
- Estar asegurado por el Plan de Seguro de Salud de Ontario (OHIP).

El cérvix (cuello uterino) forma parte del sistema reproductivo femenino. Es la parte inferior del útero y conecta el útero con la vagina.

La mayoría de los cánceres son el resultado de muchos factores de riesgo con diferentes niveles de influencia. Es cierto que la mayoría de las mujeres que desarrollan cáncer cervical han tenido una infección por HPV, pero tener HPV no significa que se desarrollará cáncer cervical.

Aunque muchos tipos de HPV pueden infectar el cérvix, solo algunos causan cambios anormales en las células que pueden convertirse en cáncer. Esto ocurre principalmente en mujeres menores de 50 años y el cáncer también puede diseminarse (hacer metástasis) a otras partes del cuerpo.

El cáncer cervical puede no causar signos ni síntomas en sus etapas tempranas. Los síntomas suelen aparecer cuando el tumor crece hacia los tejidos y órganos cercanos. Estos pueden incluir sangrado vaginal anormal y/o dolor pélvico anormal.

Para más información, hable con su proveedor de atención médica. También puede consultar las siguientes referencias:

Canadian Cancer Society website: <https://cancer.ca/en/cancer-information/cancer-types/cervical>

Cancer Care Ontario website: <https://www.cancercareontario.ca/en/guidelines-advice/cancer-continuum/screening/hpv-hub>



For more information on SCHC Programs and Services go to:

www.schcontario.ca

If you wish to support SCHC and the Scarborough community please go to:

www.schcontario.ca/donate-now

All graphics and audio are in compliance with copyright laws. Follow us on social media!

